

注意事項

1. 只供陰道用。切勿吞服。
2. 依照醫生指示使用藥物。
3. 如果曾對藥物有過敏反應，使用前請先向醫生或藥劑師查詢。
4. 建議於睡前使用栓劑。
5. 必須按指示完成整個療程。即使經期開始，仍須繼續用藥，不可中斷。
6. 過期或完成療程後剩餘之藥物應立即棄掉。
7. 切勿與他人共用藥物。
8. 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前請先告知醫生和藥劑師。
9. 用藥後如果情況持續或惡化，應立即求醫。
10. 栓劑會於體溫下融化，用藥期間可能有藥液自陰道流出，建議使用衛生巾，以免沾污衣物。

可能出現的副作用

若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚痕癢、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

忘記用藥處理方法

應儘快補用適量的劑量，若記起時已接近使用下一劑量的時間，便不必補用，只需依時使用下一劑量。

切勿使用雙倍的劑量。

貯存藥物須知

1. 把藥物存放在孩童不能觸及的地方。
2. 把藥物存放在陰涼乾爽的地方，避光保存。




如有疑問，

請向你的醫生、藥劑師或有關的醫護人員

查詢。

陰道栓劑 (陰道藥片)



藥劑職系及服務統籌委員會
CDC-Grade (Pharmaceutical Services)



醫院管理局
HOSPITAL
AUTHORITY

S/N: 039Cv4 (10/2021)



甚麼是陰道栓劑？

陰道栓劑是一種用於陰道內的藥物劑型。




用途

陰道栓劑常用於治理陰道感染。


使用方法

1. 徹底清潔雙手。
2. 除去栓劑外的包裝。
3. 仰臥床上，曲起雙膝，張開雙腳，使栓劑較易放入。



如有投藥器 (注意：懷孕期間，切勿使用投藥器)


4. 將投藥器的活塞拉出，並將栓劑放入投藥器內。



5. 小心地把投藥器輕輕放入陰道深處。



6. 輕力按下活塞，把栓劑釋放在陰道內，然後將投藥器整個拉出。



7. 如每次需使用兩片栓劑，請重覆以上步驟。
8. 保持臥姿，以防栓劑掉出。
9. 將活塞由投藥器抽出，用暖肥皂水將投藥器和活塞清洗，然後弄乾。最後清潔雙手。



如沒有投藥器

4. 可用手指將栓劑小心地放入陰道深處。
5. 如每次需使用兩片栓劑，請重覆以上步驟。
6. 保持臥姿，以防栓劑掉出。
7. 最後清潔雙手。