

注意事項

7. 用藥後如果情況持續或惡化，應立即求醫。
8. 未開啓的眼藥膏已經過消毒，開啟後應保持眼藥膏清潔。
9. 用藥期間請勿配戴隱形眼鏡。

可能出現的副作用

使用藥物後視覺可能會暫時變得模糊或眼部出現輕微不適。在視覺回復清晰前，切勿駕駛汽車或操作機器。如情況持續，請通知醫生或藥劑師。

若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚痕癢、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

忘記用藥處理方法

應儘快補用適量的劑量，若記起時已接近使用下一劑量的時間，便不必補用，只需依時使用下一劑量。

切勿使用雙倍的劑量。

貯存藥物須知

1. 把藥物存放在孩童不能觸及的地方。
2. 把藥物存放在陰涼乾爽的地方，避光保存。
3. 除標籤有特別指示外，眼藥膏毋需存放於雪櫃內。




如有疑問，

請向你的醫生、藥劑師或有關的醫護人員

查詢。

眼藥膏



藥劑職系及服務統籌委員會
CDC-Grade (Pharmaceutical Services)



醫院管理局
HOSPITAL
AUTHORITY

S/N: 028Cv4 (10/2021)

? 什麼是眼藥膏？

眼藥膏是外用藥物，用於眼睛上發揮作用。



! 用途

眼藥膏主要用於舒緩眼部不適或治療乾澀、感染等。

使用方法

1. 徹底清潔雙手。
2. 如有配戴隱形眼鏡，用藥前請先除下。
3. 扭開眼藥膏蓋時，小心避免觸碰到眼藥膏的瓶咀。



4. 頭部仰後或躺臥床上。眼睛望向上方，用手指輕輕把下眼皮向下拉，形成袋狀。



5. 擠出約 4 至 5 毫米（約一粒米大小）眼藥膏在眼袋內。塗藥時避免瓶咀接觸眼睛、睫毛或其他東西，以免弄傷眼睛，及保持瓶咀清潔。



6. 塗上眼藥膏後閉上眼睛，同時轉動眼球，使藥膏均勻分佈在眼內。用紙巾拭去多餘的眼藥膏。
7. 用後應立即把眼藥膏蓋好，不用清潔瓶咀。
8. 如果同一眼睛需要使用多於一種眼藥水或眼藥膏，兩者需要相隔最少 5 至 10 分鐘才能使用。



如有需要，

請讓家人或他人協助使用眼藥膏。

注意事項

1. 只供用於眼睛。
2. 依照醫生指示使用藥物。
3. 如果曾對藥物有過敏反應，使用前請先向醫生或藥劑師查詢。
4. 眼藥膏經開啟後請按照標籤上指定的使用期限。過期或完成療程後剩餘之藥物應立即棄掉。
5. 切勿與他人共用藥物。
6. 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前請先告知醫生和藥劑師。