

7. 藥樽內或會有少量藥液剩餘，並不影響正確劑量。
8. 使用過的物品（如藥樽等）丟棄，並徹底清潔雙手。

注意事項

1. 只供肛門用。切勿吞服。
2. 依照醫生指示使用藥物。
3. 如果曾對藥物有過敏反應，使用前請先向醫生或藥劑師查詢。
4. 此藥物可引致嗜睡、健忘、反應遲緩及動作不協調，用後切勿駕駛及操作機械。
5. 酒精可加劇藥物的副作用，用藥後應避免飲用酒精飲品。
6. 過期或完成療程後剩餘之藥物應立即棄掉。
7. 切勿與他人共用藥物。
8. 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前請先告知醫生和藥劑師。
9. 用藥後如果情況持續或惡化，應立即求醫。
10. 劑液正常呈無色透明或淡黃色，如出現異常或變色，切勿使用。

可能出現的副作用

常見的副作用包括嗜睡、頭暈、肌肉無力、意識混亂等。

副作用會較常出現於年長患者中。

於使用藥物後出現過敏反應如皮膚痕癢、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

貯存藥物須知

1. 把藥物存放在孩童不能觸及的地方。
2. 把藥物存放在陰涼乾爽的地方，避光保存。




如有疑問，

請向你的醫生、藥劑師或有關的醫護人員

查詢。

S/N: 023Cv4 (10/2021)

地西洋直腸劑液




藥劑職系及服務統籌委員會
CDC-Grade (Pharmaceutical Services)



什麼是地西洋直腸劑液？

地西洋是一種抗抽搐藥物，此藥物經由肛門注入，從而發揮抗抽搐作用。



用途

地西洋直腸劑液適用於緊急情況下控制抽搐，如持續抽搐和小童熱痙攣（因發燒而引起的抽搐）。




藥理作用


地西洋直腸劑液由直腸粘膜吸收後會被迅速傳遞到大腦，並在5至10分鐘內產生藥效。

使用方法


1. 使用前扭開保護瓶蓋，如適用。




2. 讓患者俯伏或側臥，並將軟枕放於盤骨下。小童則可俯伏於成人膝上。




3. 將膠管慢慢地插入肛門。切勿在膠管完全插入肛門前擠壓藥樽。1歲至3歲小童只需插入膠管長度的一半。



4. 在膠管插入肛門後，用手指擠壓藥樽以確保所需份量的藥物能進入體內。



5. 使用藥物時，應保持藥樽傾斜，樽咀向下。



6. 在移除膠管時保持按壓藥樽，然後將兩邊臀部緊貼片刻以防止滲漏。

