

## 注意事項

- 由於疥瘡的潛伏期可達數星期，患者各家庭成員及護理員亦應求醫接受檢查。
- 即使成功清除疥瘡，痕癢仍可能持續 4 星期。但如果病徵持續或皮膚出現其他變化，應立即求醫。
- 避免接觸眼睛。如乳劑不慎入眼，應立即以大量清水沖洗。如有需要，請立即求醫。
- 請勿在熱水沐浴後立即使用乳劑。
- 過期或完成療程後剩餘之藥物應立即棄掉。
- 切勿與他人共用藥物。
- 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前請先告知醫生和藥劑師。
- 用藥後如果情況持續或惡化，應立即求醫。
- 除醫生特別指示外（例如病情較嚴重的挪威型疥瘡或結痂型疥瘡），在一般情況下，塗敷乳劑一次便已足夠。

## 可能出現的副作用

常見的副作用包括痕癢、皮膚紅腫或接觸性皮炎等。

若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚痕癢、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

## 忘記用藥處理方法

應儘快補用適當的劑量，如持續有疥瘡徵狀應及早求醫。

## 貯存藥物須知

- 把藥物存放在孩童不能觸及的地方。
- 把藥物存放在陰涼乾爽的地方，避光保存。



如有疑問，

請向你的醫生、藥劑師或有關的醫護人員

查詢。

# 氯菊酯（百滅寧） 乳劑 5%（疥瘡用）



藥劑職系及服務統籌委員會  
CDC-Grade (Pharmaceutical Services)



醫院管理局  
HOSPITAL  
AUTHORITY

S/N: 038Cv4 (10/2021)



## 什麼是氯菊酯乳劑？

氯菊酯乳劑是用於皮膚以治療疥瘡的外用藥物。



## 什麼是疥瘡？

疥瘡是疥蟎蟲引起的皮膚病。疥蟎是一種寄生蟲，會鑽入人體皮膚寄居及繁殖。疥瘡通常透過直接接觸患者的皮膚而傳播。患者的衣物和被褥亦可能帶有疥蟎及蟲卵，繼而傳播此病。在家庭成員之間和院舍機構內傳播亦很常見。

患者會感到非常痕癢，在晚間或沐浴後尤為嚴重。受影響的部位包括手指罅隙的皮膚、手腕、肘部、腋窩、乳頭、下腹、外生殖器官、臀部及腹股溝等部位的皮膚褶。皮膚表面可能會出現紅疹、線狀損痕或小水泡；面部及頭皮一般不受影響。

## 使用方法

1. 於晚上使用，先以溫水沐浴，再抹乾全身。
2. 將乳劑搖勻。
3. 將乳劑由頸部開始往下，塗遍全身，尤其是皮膚摺疊位置，例如手指、腳趾縫間、腋下及腹股溝。避免接觸傷口及敏感部位。如有需要，可用排筆協助塗藥。
4. 如疥瘡伸延至頸部以上，則可將乳劑塗遍全身，並包括頭皮、面部及雙耳外部皮膚。避免接觸眼睛。
5. 待乳劑乾後，穿上清潔衣服，毋須洗手。
6. 待 8 至 14 小時後，用溫水及肥皂徹底沖淨乳劑，並用清潔毛巾抹乾及換上清潔衣服。



### 如有需要，

請讓家人或他人協助使用乳劑。  
協助他人使用時，應先戴上即棄手套。

## 注意事項

1. 只供外用。如不慎誤服，請立即求醫。
2. 依照醫生處方使用藥物。
3. 如果曾對藥物有過敏反應，使用前請先向醫生或藥劑師查詢。
4. 使用乳劑治療期間，每次洗手後必需重塗乳劑。
5. 患者的衣物、床單、被鋪、枕袋等須與其他家人或院友的物品分開清洗，並應以攝氏 60 度或以上的熱水洗濯不少於 10 分鐘，以消滅疥蟎蟲及其蟲卵。難以清洗的物品，如鞋、床褥等，可放入膠袋後密封最少 7 日，才如常使用。

攝氏 **60°** 或以上

不少於  
**10** 分鐘



最少 **7** 天