


注意事項

1. 只供噴鼻用。
2. 依照醫生指示使用藥物。請勿使用超過醫生處方之療程。
3. 如果曾對藥物有過敏反應，使用前請先向醫生或藥劑師查詢。
4. 噴鼻劑經開啟後請參照標籤上指定的期限使用。過期或完成療程後剩餘之藥物應立即棄掉。
5. 切勿與他人共用藥物。
6. 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前請先告知醫生和藥劑師。
7. 第一次使用前，須充分搖勻藥瓶並向空中按壓數次直至噴出噴霧，以確保噴鼻劑能順利噴出藥物。如有一段時間未使用噴鼻劑(按產品說明)，請向空中按壓一次，確保噴出噴霧後方可使用。



8. 依照產品說明定時清潔噴鼻劑。
9. 用藥後如果情況持續或惡化，應立即求醫。

可能出現的副作用

噴鼻劑可能會在口腔留下味道。如有這種情況發生，可用清水漱口。

若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚痕癢、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

忘記用藥處理方法

應儘快補用適量的劑量，若記起時已接近使用下一劑量的時間，便不必補用，只需依時使用下一劑量。

切勿使用雙倍的劑量。

貯存藥物須知

1. 把藥物存放在孩童不能觸及的地方。
2. 把藥物存放在陰涼乾爽的地方，避光保存。



如有疑問，

請向你的醫生、藥劑師或有關的醫護人員

查詢。

噴鼻劑



藥劑職系及服務統籌委員會
CDC-Grade (Pharmaceutical Services)



醫院管理局
HOSPITAL
AUTHORITY

S/N: 035Cv4 (10/2021)

? 什麼是噴鼻劑？

噴鼻劑是藥物溶劑或懸浮劑。藥物被直接噴入鼻孔內，一般在鼻腔發揮作用。



! 用途

一般情況下，噴鼻劑用於治療及控制慢性鼻炎和鼻敏感；噴鼻劑也可用於紓緩傷風感冒時的鼻塞症狀。

但是部份噴鼻劑可用於治療其他疾病；如有疑問，請向醫生或藥劑師查詢。

使用方法

不同產品的用法可能有少許差異，請依照個別產品指示使用。

1. 在使用噴鼻劑之前擤清鼻腔。



2. 用肥皂及清水清潔雙手。
3. 先把噴鼻劑搖勻，然後打開瓶蓋。
4. 頭稍向前傾並保持藥瓶垂直。
5. 用手指輕輕按著一邊鼻孔。
6. 將噴咀放進另一邊鼻孔，將噴咀指向鼻孔外側，遠離鼻中隔。



7. 用手指按壓噴鼻劑一次，同時用鼻慢慢吸氣。



8. 拿出噴咀，然後用口呼氣。



9. 如有需要在同一鼻孔中噴入第二劑，請搖勻噴鼻劑，並重複步驟 4 至 8。
10. 如有需要在另一邊鼻孔使用噴鼻劑，請搖勻噴鼻劑，並重複步驟 4 至 9。
11. 使用後，用清潔的紙巾抹乾噴咀，蓋回瓶蓋。



使用後，

儘量避免立即打噴嚏或擤鼻。