

注意事項

11. 使用栓劑後的數分鐘，可能感到便意要把藥物排出。這感覺會在栓劑溶化後逐漸消失。
12. 除非栓劑用作通便，應避免在用藥後1小時內排便。



13. 用藥後如果情況持續或惡化，應立即求醫。

可能出現的副作用

常見的副作用包括肛門輕微刺激或灼熱、腹瀉、腹部不適等。

若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚痕癢、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

忘記用藥處理方法

應儘快補用適量的劑量，若記起時已接近使用下一劑量的時間，便不必補用，只需依時使用下一劑量。

切勿使用雙倍的劑量。

貯存藥物須知

1. 把藥物存放在孩童不能觸及的地方。
2. 把藥物存放在陰涼乾爽的地方，避光保存。
3. 除標籤有特別指示外，栓劑一般毋需存放於雪櫃內。




如有疑問，

請向你的醫生、藥劑師或有關的醫護人員

查詢。

肛門栓劑




藥劑職系及服務統籌委員會
CDC-Grade (Pharmaceutical Services)



什麼是肛門栓劑？

肛門栓劑，俗稱肛門塞藥，是一種經由肛門塞進直腸中的藥物劑型。




用途

肛門栓劑常用於治理便秘或痔瘡。此外，亦有栓劑適用於不能口服用藥的病人。



使用方法

1. 徹底清潔雙手。
2. 戴上即棄指套或即棄手套。

3. 除去肛門栓劑外的包裝。



4. 向側臥，然後伸直臥側的腿部，並向腹部屈曲另一邊腿。




5. 用手將臀部肌肉揪起，使肛門位置外露。



6. 用另一邊手將栓劑從尖的一端塞進肛門內，嬰兒應塞至約2厘米深，成人則約3厘米深。

7. 為避免栓劑流出，應保持臀部肌肉收緊數秒，並維持側臥姿勢約5至15分鐘。



8. 丟掉即棄指套或手套，然後徹底清潔雙手。



如有需要，

請讓家人或他人協助使用肛門栓劑。

注意事項

1. 只供肛門用。切勿吞服。
2. 依照醫生指示使用藥物。
3. 如果曾對藥物有過敏反應，使用前請先向醫生或藥劑師查詢。
4. 過期或完成療程後剩餘之藥物應立即棄掉。
5. 切勿與他人共用藥物。
6. 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前請先告知醫生和藥劑師。
7. 若栓劑變得太軟，可把未拆除包裝的栓劑浸在冷水中或放置於雪櫃一會兒，令栓劑變硬，以便使用。
8. 如栓劑需要冷藏貯存，可先把栓劑放置於室溫一會兒然後使用。
9. 用水溶性潤滑劑或水塗於栓劑上可更容易使用。
10. 如經指示只需使用半片栓劑，可垂直切開兩半。剩餘的半片栓劑可留作下一劑量使用。

