

## 可能出現的副作用

滴鼻藥水可能會在口腔留下味道。如有這種情況發生，可用清水嗽口。

若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚痕癢、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

## 忘記用藥處理方法

應儘快補用適量的劑量，若記起時已接近使用下一劑量的時間，便不必補用，只需依時使用下一劑量。

切勿使用雙倍的劑量。

## 貯存藥物須知

1. 把藥物存放在孩童不能觸及的地方。
2. 把藥物存放在陰涼乾爽的地方，避光保存。




如有疑問，

請向你的醫生、藥劑師或有關的醫護人員

**查詢。**

S/N: 034Cv4 (10/2021)

# 滴鼻藥水



藥劑職系及服務統籌委員會  
CDC-Grade (Pharmaceutical Services)



醫院管理局  
HOSPITAL  
AUTHORITY



## 什麼是滴鼻藥水？

滴鼻藥水是藥物溶劑或懸浮劑。藥物被直接滴入鼻孔內，一般在鼻腔發揮作用。



## 用途

滴鼻藥水用於紓緩傷風感冒、慢性鼻炎和鼻敏感所引起的鼻塞等症狀。

## 使用方法

1. 在使用滴鼻藥水之前擤清鼻腔。



2. 用肥皂及清水清潔雙手。
3. 打開瓶蓋。

4. 坐在椅上，將頭仰後靠著椅背；或躺在床上，放枕頭在肩背下，令頭部仰後。



5. 小心將滴咀對準鼻孔，按醫生指示的劑量，將藥水滴入鼻孔。避免滴咀接觸到鼻腔內壁，以保持滴咀清潔。
6. 讓頭部保持後仰約 2 分鐘，使藥水流入鼻內。
7. 如果醫生或藥劑師建議在兩邊鼻孔使用滴鼻藥水，請在另一鼻孔重複步驟 5 至 6。
8. 不必清洗滴咀。使用後蓋回瓶蓋。
9. 完成滴鼻後清潔雙手。



### 使用後，

儘量避免立即打噴嚏或擤鼻。

### 如有需要，

請讓家人或他人協助使用滴鼻藥水。

## 注意事項

1. 只供滴鼻用。
2. 依照醫生指示使用藥物。請勿使用超過醫生處方之療程。
3. 如果曾對藥物有過敏反應，使用前請先向醫生或藥劑師查詢。
4. 過期或完成療程後剩餘之藥物應立即棄掉。
5. 切勿與他人共用藥物。
6. 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前請先告知醫生和藥劑師。
7. 用藥後如果情況持續或惡化，應立即求醫。